Volet 2


Signature:





Compte rendu type pour un bilan ophtalmologique à joindre au certificat médical destiné à la Maison départementale des personnes handicapées

Nom:	Prénom:	Âge:
Diagnostic principal:		
Pathologies associées: L'acuité visuelle de loin doit être mesurée avec la meilleure correction optique tolérée (en dehors de tout système optique grossissant) et transposée en système décimal. L'acuité visuelle de lecture doit être mesurée avec l'addition liée à l'âge et en lecture fluide.		
Acuité visuelle avec correction :	Œil droit	Œil gauche
- de loin (équivalent échelle de Monoyer)		
- de lecture (équivalent échelle de Parinaud à 40 cm) Remarque: les éléments suivants sont particulièrement importants à renseigner dans la mesure où ils apportent des éléments complémentaires sur l'importance de l'atteinte visuelle.		
Le champ visuel binoculaire est-il normal? Oui Non (compléter le tracé au verso)		
La vision des couleurs est-elle normale? Oui Non (préciser)		
La sensibilité aux faibles contrastes est-elle normale? Oui Non (préciser)		
Autres signes cliniques: (préciser)		
 Nystagmus Oui Non Diplopie Oui Non Photophobie Oui Non Oui Non Présence d'hallucinose Oui Non 		
Évolution prévisible des troubles: amélioration stabilité aggravation non définie		
Si amélioration : Dans quel délai?	Comment?	
Retentissement fonctionnel des troubles visuels sur la vie personnelle, sociale et/ou professionnelle: questionnaire pratique • Difficultés dans: (cocher si nécessaire le besoin de tierce personne) - La lecture et l'écriture? - La reconnaissance des visages à 1 m? - Les gestes de la vie quotidienne? (ex: préparation et prise des repas) - Utilisation du téléphone et appareils de communication? - Adresse gestuelle? (ex: tendance à casser, verser à côté, renverser, se cogner) - Les déplacements intérieurs? - Les déplacements extérieurs? • Nécessité d'aides techniques spécialisées? (optique, canne blanche, autres) • Non Préciser: • Incompréhension des difficultés visuelles par les tiers? Oui Non Non Voui Non Préciser:		
Àle		Cachet



Le champ visuel binoculaire est apprécié à la coupole de Goldman avec le test III/4 sans dissociation des deux yeux (ou équivalent).